

Características Técnicas



Cliente: DENTAID, S.L.

H.P.: 10003

Producto: PERIOAID INT. CARE GEL 75 FILIALS

Código: 1004420

Anula a: 1003168

Papel: OFFSET

Gramaje: 60g

C. Barras:

Medidas: 200 x 160 mm

Medidas Plegado: 32 x 200 mm (con pestaña de 2mm)

Tipografía: TRAZADA

Colores: I+I P. 431

C.I.: 73338

Fecha: 29 / 05 / 2017

**A corregir
Aprobado**

Fecha y Firma

PERIO·AID

INTENSIVE CARE

0,12% CLOREXIDINA DIGLUCONATO

IT.

COMPOSIZIONE

Clorexidina Digluconato 0,12%

INDICAZIONI

- Dopo le cure odontoiatriche
- In persone con eccessiva formazione di placca dentale (biofilm orale)
- Per uso topico nel cavo orale
- Contemporaneamente all'uso di un collutorio a base di Clorexidina. Perio-Aid Intensive Care Gel non contiene agenti anionici che potrebbero interferire con l'attività della Clorexidina.

MODO D'USO

- Spazzolare accuratamente i denti almeno 2 volte al giorno, con particolare attenzione alle zone affettate. NON INGERIRE.
- Anche per uso topico nel cavo orale.

EFFETTI COLLATERALI

- In certi casi può apparire una alterazione del gusto e in molto rare occasioni irritazione nella lingua, entrambi gli effetti diminuiscono con l'uso continuo del prodotto.
- Questo prodotto contiene Clorexidina che, temporaneamente, può pigmentare denti e lingua. Tale evento può presentarsi occasionalmente solo dopo un uso prolungato e in presenza di alcuni alimenti e bevande cromogene, quali ad esempio vino rosso, caffè, tè e nel caso di fumatori.
- Queste pigmentazioni non sono permanenti e si possono evitare con una buona igiene orale, con lo spazzolamento e l'uso di prodotti per l'igiene interprossimale prima di usare il collutorio. Le pigmentazioni possono sempre essere eliminate dal professionista del cavo orale.

PRESENTAZIONE

PERIO·AID Intensive Care

0,12% Clorexidina + 0,05% CPC

- Collutorio 150 ml
- Collutorio 500 ml
- Spray 50 ml

PERIO·AID Intensive Care

0,12% Clorexidina

- Gel per uso topico o spazzolamento dei denti 75 ml

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a luce solare diretta.
Non utilizzare in caso di sensibilità ad alcuno degli ingredienti.

GEL PER USO TOPICO O
SPAZZOLAMENTO DEI DENTI

COMBATTE IL
BIOFILM ORALE

1004420

PERIO·AID

INTENSIVE CARE

0,12% CHLORHEXIDINDIGLUCONAT

BEKÄMPFT DEN
ORALEN BIOFILM

GEL ZUM ZÄHNEPUTZEN UND
ZUR LOKALEN ANWENDUNG

DE.

ZUSAMMENSETZUNG

Chlorhexidinedigluconat 0,12%

ANWENDUNGSBEREICHE

- Nach der zahnärztlichen Behandlung
- Für Personen mit einer übermäßigen Ansammlung von dentaler Plaque (oralem Biofilm)
- Für bestimmte Bereiche im Mund
- Die gleichzeitige Verwendung einer Mundspülung auf der Basis von Chlorhexidin ist möglich. Perio-Aid Intensive Care Gel enthält keine anionischen Inhaltsstoffe, die die Wirkung von Chlorhexidin beeinträchtigen könnten.

ANWENDUNGSHINWEIS

- Putzen Sie die Zähne mindestens 2 Mal täglich sorgfältig und achten Sie dabei besonders auf die betroffenen Bereichen. NICHT SCHLUCKEN.
- Dieses Gel kann auch örtlich aufgetragen werden.

ALLGEMEINE HINWEISE

- In manchen Fällen können Veränderungen der Geschmacksempfindung während der Anwendung auftreten, die jedoch im Allgemeinen mit der Zeit abnehmen.
- Dieses Produkt enthält Chlorhexidin, einen Inhaltsstoff, der Zähne und Zunge vorübergehend verfärbt kann. Diese Verfärbung tritt normalerweise erst nach längerer Anwendung des Produkts und bei Kontakt mit bestimmten Speisen und Getränken, wie Rotwein, Kaffee, Tee und Tabak auf.
- Diese Verfärbungen sind nicht dauerhaft und können durch sorgfältiges Zähneputzen und die Verwendung von Interdentalbürsten vor Verwendung der Mundspülung vermieden werden. Verfärbungen können auch von Ihrer Zahnarztpraxis leicht entfernt werden.

PACKUNGSGRÖSSEN

PERIO·AID Intensive Care

0,12% Chlorhexidin

- Gel 75 ml zum Zähneputzen und zur lokalen Anwendung

PERIO·AID Active Control

0,05% Chlorhexidin + 0,05% CPC

- Mundspülung 150 ml
- Mundspülung 500 ml

Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen. Nicht verwenden, wenn eine Empfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe vorliegt.



Made by DENTAID S.L.

Distributed in the EU by: visit www.dentaid.com



PERIO·AID

INTENSIVE CARE

0,12% CHLOORHEXIDINE DIGLUCONATE

NL.

SAMENSTELLING

Chloorhexidine digluconate 0,12%

INDICATIES

- Na tandheelkundige behandelingen
- Bij overmatige tandplaquevorming (orale biofilm)
- Voor meer lokale gebieden in de mond
- Te gebruiken in combinatie met een chloorhexidine mondspoelmiddel. Perio-Aid Intensive Care Gel bevat geen anionische bestanddelen die de activiteit van de chloorhexidine zouden kunnen beïnvloeden.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- Poets de tanden zorgvuldig ten minste 2x per dag waarbij extra aandacht besteed dient te worden aan de gebieden die extra zorg nodig hebben. NIET DOORSLIKKEN.
- Deze gel kan ook lokaal gebruikt worden.

BIJWERKINGEN

- Een verandering van smaakperceptie kan in sommige gevallen optreden, irritatie van de tong komt zeer incidenteel voor. Beide effecten verminderen wanneer het gebruik van het product gecontinueerd wordt.
- Dit product bevat de stof Chloorhexidine, een bestanddeel dat de tanden, kiezen en tong tijdelijk kan verkleuren. Deze verkleuringen treden in de regel op na langdurig gebruik en wanneer tijdens de periode van gebruik tevens bepaalde dranken en voedingswaren worden gebruikt zoals rode wijn, koffie, thee en tabak.
- Deze verkleuringen zijn niet permanent en kunnen voor een groot deel worden voorkomen door een goede mondhygiëne. Poets de tanden zorgvuldig en reinig ook tussen de tanden met interdentale hulpmiddelen (rangers) voorafgaand aan het spoelen met het mondspoelmiddel. Mocht dat niet effectief genoeg zijn dan kan een tandarts van mondhygiëniste de aanslag verwijderen.

PRODUCTEN

PERIO·AID Intensive Care
0,12% Chloorhexidine + 0,05% CPC
- Mondspoelmiddel 500 ml
- Mondspray 50 ml

PERIO·AID Intensive Care
0,12% Chloorhexidine
- Gel om mee te poetsen of lokaal aan te brengen 75 ml

Buiten het bereik van kinderen houden. Niet in het zonlicht bewaren. Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.

GEL OM MEE TE POETSEN
OF LOKAAL AAN TE BRENGEN

BESTRIJDT DE
ORALE BIOFILM

PERIO·AID

INTENSIVE CARE

0,12% DIGLUCONATE DE CHLORHEXIDINE

LUTTE CONTRE
LE BIOFILM ORAL

GEL POUR LE BROSSAGE
DENTAIRE OU À USAGE TOPIQUE

FR.

COMPOSITION

Digluconate de chlorhexidine 0,12%

INDICATIONS

- Après les soins dentaires
- En cas d'accumulation excessive de plaque dentaire (biofilm oral)
- Pour une application locale en bouche
- À combiner avec un bain de bouche à base de chlorhexidine. Perio-Aid Intensive Care Gel ne contient pas d'agents anioniques susceptibles d'altérer l'activité de la chlorhexidine.

MODE D'EMPLOI

- Brossez-vous les dents soigneusement, au moins deux fois par jour, en portant une attention particulière aux zones cibles. NE PAS AVALER.
- Ce gel peut également être utilisé en application locale.

EFFECTS SECONDAIRES

- Un changement de perception du goût peut se produire dans certains cas, et une irritation de la langue dans de très rares occasions. Les deux effets diminuent avec l'utilisation continue du produit.
- Ce produit contient de la chlorhexidine, qui peut entraîner une coloration réversible des dents. Du fait de la faible concentration en chlorhexidine, cette coloration se produit très rarement et seulement après une utilisation prolongée, associée à la prise de boissons comme le vin rouge, le café ou à la consommation de tabac.
- Ces colorations ne sont pas permanentes et peuvent être évitées en grande partie en adoptant une bonne hygiène bucco-dentaire. Brossez vos dents avec soin et nettoyez également vos espaces interdentaires à l'aide d'un outil adapté (brossettes) avant de rincer avec le bain de bouche. Si cette méthode n'est pas assez efficace, un dentiste pourra éliminer les taches.

GAMME

PERIO·AID Intensive Care
0,12% Chlorhexidine + 0,05% CPC
- Flacon de 150 ml
- Flacon de 500 ml
- Spray 50 ml

PERIO·AID Active Control
0,05% Chlorhexidine + 0,05% CPC
- Flacon de 150 ml
- Flacon de 500 ml

PERIO·AID Intensive Care
0,12% Chlorhexidine
- Gel dentifrice pour le brossage et à usage topique 75 ml

Garder hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la lumière solaire directe.
Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à l'un des composants

