

PERIO-AID

INTENSIVE CARE

0,12% CLOREXIDINA + 0,05% CPC

COMBATTE IL BIOFILM ORALE

IT.

COMPOSIZIONE

Clorexidina Digluconato 0,12%
Cetilpiridinio Cloruro 0,05%

INDICAZIONI

- Durante e dopo le cure odontoiatriche
- In persone con eccessiva formazione di placca dentale (biofilm orale)
- Quando l'uso dello spazzolino è doloroso e/o altre metodiche risultano difficoltose.
- Per la cura delle zone posteriori della bocca

MODO D'USO

- Spazzare 2-3 volte direttamente sulla zona interessata, 2-3 volte al giorno, seguendo le indicazioni del proprio professionista del cavo orale.
- Si raccomanda di non effettuare un risciacquo con acqua dopo l'uso di Perio-Aid Intensive Care spray.
- La maggior parte dei dentifrici contiene composti anionici che riducono l'efficacia della clorexidina. Pertanto dopo l'uso di questi prodotti e prima di usare Perio-Aid Intensive Care spray, sciacquare la bocca 3 volte con abbondante acqua. Perio-Aid Intensive Care gel non contiene questi agenti anionici e, di conseguenza, è totalmente compatibile con l'uso di Perio-Aid Intensive Care spray.

EFFETTI COLLATERALI

- In certi casi può apparire una alterazione del gusto e in rare occasioni irritazione della lingua, entrambi gli effetti diminuiscono con l'uso continuo del prodotto.
- Questo prodotto contiene Clorexidina che, temporaneamente, può pigmentare denti e lingua. Tale evento può presentarsi occasionalmente solo dopo un uso prolungato e in presenza di alcuni alimenti e bevande cromogene, quali ad esempio vino rosso, caffè, tè e nel caso di fumatori.
- Queste pigmentazioni non sono permanenti e si possono evitare con una buona igiene orale, con lo spazzolamento e l'uso di prodotti per l'igiene interprossimale prima di usare il collutorio. Le pigmentazioni possono sempre essere eliminate dal professionista del cavo orale.

PRESENTAZIONE

PERIO-AID Intensive Care 0,12% Clorexidina + 0,05% CPC

- Collutorio 150 ml
- Collutorio 500 ml
- Spray 50 ml

PERIO-AID Intensive Care 0,12% Clorexidina

- Gel per uso topico o spazzolamento dei denti 75 ml

PERIO-AID Active Control 0,05% Clorexidina + 0,05% CPC

- Collutorio 150 ml
- Collutorio 500 ml

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare l'esposizione alla luce solare diretta. Non utilizzare in caso di sensibilità ad alcuno degli ingredienti.

DENTAID

Made by DENTAID S.L.
Distributed in the EU by: visit www.dentaid.com



SPRAY
SENZA ALCOOL

PERIO-AID

INTENSIVE CARE

0.12% CHLORHEXIDINE + 0.05% CPC

FIGHTS ORAL BIOFILM

EN.

COMPOSITION

0.12% Chlorhexidine Digluconate
0.05% Cetylpyridinium Chloride

INDICATIONS

- During and after dental care
- For people with excessive formation of dental plaque (oral biofilm).
- When brushing is painful and/or other methods are difficult to perform.
- For cleaning backmost areas of the mouth

DOSAGE AND ADMINISTRATION GUIDELINES

- Apply 2-3 sprays directly on the affected area, twice or three times per day, following your dentist's recommendations.
- It is recommended not to rinse with water or eat for 30 minutes after using Perio-Aid Intensive Care spray.
- Most toothpastes contain anionic compounds which reduce the efficacy of chlorhexidine. Therefore, after using such products and before using Perio-Aid Intensive Care spray, you must rinse your mouth abundantly with water 3 times. Perio-Aid Intensive Care gel does not contain these anionic agents, and consequently, is perfectly compatible with Perio-Aid Intensive Care spray.

SIDE EFFECTS

- In some cases alteration of taste and irritation of the dorsal surface of the tongue may be experienced, which generally lessen with continued use of the product.
- This product contains chlorhexidine, an active ingredient that may temporarily stain teeth and tongue. This staining usually only occurs after prolonged use of the product and when in contact with certain drinks and foods, such as red wine, coffee, tea and tobacco.
- This colouring effect is not permanent and can be avoided by brushing teeth before rinsing. In any event, it can be removed by the dentist.

PACKAGING

PERIO-AID Intensive Care

0.12% Chlorhexidine + 0.05% CPC

- Mouthwash 150 ml
- Mouthwash 500 ml
- Spray 50 ml

PERIO-AID Intensive Care

0.12% Chlorhexidine

- Dental gel for topical use or for toothbrushing 75 ml

PERIO-AID Active Control

0.05% Chlorhexidine + 0.05% CPC

- Mouthwash 150 ml
- Mouthwash 500 ml

Keep out of the reach of children. Avoid exposure to direct sunlight. Not to be used by people who have experienced allergic reactions to any of the ingredients in Perio-Aid Intensive Care Spray.

Review date: February 2020

DENTAID



PERIO·AID

INTENSIVE CARE

0,12% CHLOORHEXIDINE + 0,05% CPC

MONDSPRAY
ZONDER ALCOHOL

BESTRIJDT DE
ORALE BIOFILM

NL.

SAMENSTELLING

Chloorhexidine Digluconaat 0,12%
Cetylpyridinium Chloride 0,05%

INDICATIES

- Tijdens en na tandheelkundige behandelingen
- Bij overmatige tandplaquevorming (orale biofilm)
- Wanneer tandenpoetsen of een andere manier van reiniging niet goed mogelijk is
- Voor de gedeelten ver achter in de mond

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- Twee tot drie keer per dag, na het tandenpoetsen, twee tot drie keer sprayen terwijl het buisje wordt gericht op de aangewezen plaats. Volg de instructies van uw tandarts of mondhygiënist.
- Niet met water naspoelen en niet eten of drinken tot een half uur na het gebruik van Perio Aid Intensive Care mondspray.
- De meeste tandpasta's bevatten anionische bestanddelen die de effectiviteit van chloorhexidine verminderen. Na het gebruik van deze tandpasta's, maar voor het gebruik van Perio-Aid Intensive Care mondspray, is het raadzaam om de mond 3 keer met veel water te spoelen. Perio-Aid Intensive Care gel bevat geen anionische bestanddelen waardoor het zeer goed te gebruiken is in combinatie met Perio-Aid Intensive Care mondspray.

BIJWERKINGEN

- Een verandering van smaakperceptie kan in sommige gevallen optreden, irritatie van de tong komt zeer incidenteel voor. Beide effecten verminderen wanneer het gebruik van het product gecontinueerd wordt.
- Dit product bevat de stof Chloorhexidine, een bestanddeel dat de tanden, kiezen en tong tijdelijk kan verkleuren. Deze verkleuringen treden in de regel op na langdurig gebruik en wanneer tijdens de periode van gebruik tevens bepaalde dranken en voedingswaren worden gebruikt zoals rode wijn, koffie, thee en tabak.
- Deze verkleuringen zijn niet permanent en kunnen voor een groot deel worden voorkomen door een goede mondhygiëne. Poets de tanden zorgvuldig en reinig ook tussen de tanden met interdentale hulpmiddelen (ragers) voorafgaand aan het spoelen met het mondspoelmiddel. Mocht dat niet effectief genoeg zijn dan kan een tandarts of mondhygiënist de aanslag verwijderen.

PRODUCTEN

PERIO-AID Intensive Care

0,12% Chloorhexidine + 0,05% CPC

- Mondspoelmiddel 500 ml
- Mondspray 50 ml

PERIO-AID Intensive Care

0,12% Chloorhexidine

- Gel om mee te poetsen of lokaal aan te brengen 75 ml

PERIO-AID Active Control

0,05% Chloorhexidine + 0,05% CPC

- Mondspoelmiddel 500 ml

PERIO·AID

INTENSIVE CARE

0,12% CHLORHEXIDINE + 0,05% CPC

SPRAY
SANS ALCOOL

LUTTE CONTRE
LE BIOFILM ORAL

FR.

COMPOSITION

Digluconate de Chlorhexidine 0,12%
Chlorure de Cetylpyridinium 0,05%

INDICATIONS

- Pendant et après les soins dentaires.
- En cas d'accumulation excessive de plaque dentaire (biofilm oral)
- En cas de brossage douloureux et/ou tout autre geste d'hygiène bucco-dentaire compliqué.
- Pour les zones postérieures de la bouche.

MODE D'EMPLOI

- Effectuer 2 à 3 pulvérisations vers le site désigné, 2 à 3 fois par jour, en suivant les recommandations de votre chirurgien-dentiste.
- Après usage, ne pas rincer la bouche à l'eau et ne rien manger ni boire pendant une demi-heure.
- La plupart des dentifrices contiennent des composants anioniques qui réduisent l'efficacité de la chlorhexidine. Après avoir utilisé un dentifrice de ce type, mais avant d'utiliser Perio-Aid Intensive Care spray, il est recommandé de se rincer la bouche 3 fois avec beaucoup d'eau. Le gel Perio-Aid Intensive Care ne contient aucun composant anionique, c'est pourquoi il est idéal de l'utiliser en combinaison avec Perio-Aid Intensive Care spray.

EFFETS SECONDAIRES

- Un changement de perception du goût peut se produire dans certains cas, et une irritation de la langue dans de très rares occasions. Les deux effets diminuent avec l'utilisation continue du produit.
- Ce produit contient de la chlorhexidine qui peut entraîner une coloration réversible des dents. Du fait de la faible concentration en chlorhexidine, cette coloration se produit très rarement et seulement après une utilisation prolongée, associée à la prise de boissons comme le vin rouge, le café ou à la consommation de tabac.
- Ces colorations ne sont pas permanentes et peuvent être évitées en grande partie en adoptant une bonne hygiène bucco-dentaire. Brossez vos dents avec soin et nettoyez également vos espaces interdentaires à l'aide d'un outil adapté (brossettes) avant de rincer avec le bain de bouche. Si cette méthode n'est pas assez efficace, un dentiste pourra éliminer les taches.

GAMME

PERIO-AID Intensive Care

0,12% Chlorhexidine + 0,05% CPC

- Flacon de 150 ml
- Flacon de 500 ml
- Spray 50 ml

PERIO-AID Active Control

0,05% Chlorhexidine + 0,05% CPC

- Flacon de 150 ml
- Flacon de 500 ml

PERIO-AID Intensive Care

0,12% Chlorhexidine

- Gel dentifrice pour le brossage et à usage topique 75 ml

Garder hors de portée des enfants. Prévenir des expositions solaire directe.
Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à l'un des composants

